

TRAITEMENT D'URGENCE CONTRE LA MALARIA



Il peut être indiqué, dans certaines circonstances, de confier au voyageur un traitement d'urgence contre la malaria.

Toute fièvre apparaissant plus de 7 jours après l'arrivée en zone endémique doit faire suspecter une malaria et amener le voyageur à consulter sans tarder un médecin. Une crise de malaria peut se présenter de façon très variable: cela peut aller d'un simple malaise avec impression de début de grippe jusqu'à la forme plus classique d'accès de fièvre intense pendant quelques heures et se répétant à intervalles réguliers. La crise de malaria peut s'accompagner de perte de connaissance, de jaunisse, de troubles digestifs et de nombreux autres symptômes.

QUAND UTILISER LE TRAITEMENT D'URGENCES ?

Commencez le traitement d'urgence si vous avez de la **fièvre** et que vous ne pouvez pas consulter un médecin dans les 24 heures.

Consultez ensuite un **médecin** dès que possible pour savoir si vos symptômes sont causés par la malaria ou une autre maladie, et pour être certain que le traitement est le bon.

Le traitement d'urgence peut également être utilisé lorsque le diagnostic a été posé, mais que le traitement disponible localement est peut-être de qualité inférieure.

COMMENT L'UTILISER ?

L'artéméther/luméfrantine (Riamet®):

- Le **traitement** consiste en **6 doses réparties sur 3 jours** : au moment du diagnostic, 8 heures plus tard, 24 heures plus tard, puis toutes les 12 heures (**soit après 36, 48 et 60 heures**).
- La **dose** par prise **dépend du poids** : pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans et d'au moins 35 kg: 4 comprimés par dose (soit 24 au total).
 - » Pour les enfants entre 25 et 35 kg : 3 comprimés par dose
 - » Pour les enfants entre 15 et 25 kg : 2 comprimés par dose
 - » Pour les enfants entre 5 et 15 kg : 1 comprimé par dose

Prenez ce médicament avec de la nourriture ou une boisson lactée.

Latovaquone/proguanil (e.a. Malarone®) .

- Prenez **4 comprimés en une fois** et répétez l'opération **après 24 heures** et encore une fois **après 48 heures** (12 comprimés au total).
- Prenez **toujours** ce médicament **avec de la nourriture** ou une **boisson lactée**.
- Si vous vomissez dans les trois heures suivant la prise, vous devez prendre quatre autres comprimés.
- Une **dose adaptée** est requise **pour les enfants < 40 kg**. (enfant = 20 mg/kg/j au dessus de 10 kg de poids)
- Si atovaquone/proguanil a été utilisé comme prévention, on ne peut pas l'utiliser comme traitement.

Attention que les médicaments contenant uniquement de l'artémisinine et les extraits de plantes contenant de l'artémisinine ne sont pas suffisamment efficaces