

NOODBEHANDELING VOOR MALARIA



In bepaalde omstandigheden kan het raadzaam zijn om reizigers een noodbehandeling voor malaria te geven.

Koorts die meer dan 7 dagen na aankomst in een endemische zone optreedt, moet de verdenking op malaria wekken en de reiziger ertoe aanzetten onmiddellijk een arts te raadplegen. Een malaria-aanval kan zich op zeer verschillende manieren presenteren: het kan gaan van een eenvoudige malaise met de indruk van een beginnende griep tot de meer klassieke vorm van een aanval van intense koorts die enkele uren duurt en regelmatig terugkomt. De malaria-aanval kan gepaard gaan met bewustzijnsverlies, geelzucht, spijsverteringsproblemen en vele andere symptomen.

WANNEER MOET EEN NOODBEHANDELING WORDEN TOEGEPAST?

Start een spoedbehandeling als u **koorts** heeft en niet binnen 24 uur naar een dokter kunt gaan.

Raadpleeg dan zo snel mogelijk een **arts** om erachter te komen of uw symptomen worden veroorzaakt door malaria of door een andere ziekte en om er zeker van te zijn dat de behandeling de juiste is.

Als de diagnose is gesteld, kan ook een noodbehandeling worden toegepast, maar de behandeling die lokaal beschikbaar is, kan van mindere kwaliteit zijn.

HOE GEBRUIKT U HET?

Artemether/lumefrantine (Riamet®):

- De **behandeling** bestaat uit **6 doses verspreid over 3 dagen**: op het moment van de diagnose, 8 uur later, 24 uur later en vervolgens elke 12 uur (d.w.z. na 36, 48 en 60 uur).
- De **dosis** is afhankelijk van **het gewicht**: voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar met een gewicht van minstens 35 kg: 4 tabletten per dosis (dus 24 in totaal).
 - » Voor kinderen tussen 25 en 35 kg: 3 tabletten per dosis
 - » Voor kinderen tussen 15 en 25 kg: 2 tabletten per dosis
 - » Voor kinderen tussen 5 en 15 kg: 1 tablet per dosis

Neem dit geneesmiddel in met voedsel of melk.

Atovaquon/proguanil (bijv. Malarone®)

- Neem **4 tabletten** tegelijk en herhaal dit **na 24 uur** en opnieuw **na 48 uur** (12 tabletten in totaal).
- Neem dit geneesmiddel **altijd in met voedsel of melk**.
- Als u binnen drie uur na inname van de tabletten braakt, moet u nog vier tabletten innemen.
- **Voor kinderen < 40 kg** is een aangepaste dosis vereist (kinderen = 20 mg/kg/d boven 10 kg gewicht).
- Als atovaquon/proguanil is gebruikt voor preventie, kan het niet worden gebruikt voor behandeling.

Wees u ervan bewust dat geneesmiddelen die alleen artemisinine en plantenextracten met artemisinine bevatten niet voldoende effectief zijn.